



Skendräktighet

Många tikar ändrar beteende några veckor efter löp.

De kan bli nedstämda, griniga, tappa aptiten eller få mer aptit och börja ”boa”. Somliga tar sig t.ex ett mjukdjur som valp och bär runt på. De kan också få mjölkstinna juver och gå upp i vikt. Upp emot hälften av alla tikar blir skendräktiga, men det kan skilja mycket på hur jobbigt det är både för hunden och husse och matte.

Skendräktighet är egentligen ingen sjukdom utan något normalt hos hundar och andra hunddjur. Funktionen är att en skendräktig tik med mjölk i juveren ska kunna ta hand om andra valpar i en hund- eller vargflock om dessa blir föräldralösa.

Den bakomliggande orsaken är dräktighetshormonet progesteron. Progesteron upprätthåller dräktighet och de funktioner som ger juvertillväxt och mjölkproduktion. Efter ägglossningen stiger progesteronet hos tiken och ligger högt under dräktighetsperioden på cirka två månader. Detta sker oavsett om tiken blivit parad och dräktig eller inte.

Skendräktigheten kan i vissa fall vara väldigt påfrestande både för hunden och dess ägare och pågå under flera veckor. Man kan lindra symtomen genom att dra ned på maten och motionera mer. Även om tiken kanske helst vill ha det tvärtom...

Det finns även receptbelagd medicin (Galastop®) som kan avbryta eller förkorta symtomen. Fråga din veterinär! Om skendräktigheterna alltid är väldigt jobbiga och pågår under lång tid kan kastration vara ett alternativ.



Leg.vet Per Bransell
Specialist i hundens och kattens sjukdomar
Vettris Falun

vettris⁺
Falun

Hitta din närmaste Vettris: vettris.se